

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
27.02.2006 № 85
Регистрационное удостоверение
№ UA/4204/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ПРОСТАТОФИТ
(PROSTATOPHYTUM)

Общая характеристика:

основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость бурого цвета, со специфическим запахом. Допускается наличие осадка;

состав: 1 мл настойки сложной содержит биологически активные вещества из смеси растительного сырья: корней крапивы 0,04 г; корневищ аира 0,02 г; цветков ромашки 0,02 г; травы донника 0,02 г; травы чистотела 0,02 г; травы пустырника 0,02 г; почек березовых 0,02 г; плодов софоры японской 0,02 г; листьев шалфея 0,02 г;

вспомогательные вещества: спирт этиловый 70%.

Форма выпуска. Настойка сложная.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при доброкачественной гипертрофии предстательной железы. Прочие препараты.
Код АТС G04C X10**.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика. Влияет на обмен веществ в предстательной железе и корректирует уродинамику. ПРОСТАТОФИТ обладает противовоспалительным (угнетает экссудативные процессы и развитие фиброзно-грануляционной ткани, снижает выраженность воспалительной реакции), анальгетическим и спазмолитическим действием, а также умеренной антиандрогенной активностью при повышенном (но не нормальном) уровне андрогенов.

Фармакокинетика. Принимая во внимание, что компоненты препарата имеют растительное происхождение и действие препарата является совокупным действием его компонентов, фармакокинетические исследования препарата не проводились.

Показания к применению. Лечение хронических простатитов, в комплексной терапии начальной стадии доброкачественной гиперплазии предстательной железы, а также неспецифических воспалительных заболеваний мочевыводящих путей; для профилактики нарушений функции предстательной железы и уродинамики, обусловленных возрастом.

Способ применения и дозы. ПРОСТАТОФИТ применяют внутрь, из расчета 5-10 мл (1-2 чайных ложки) на 80-120 мл (1/3-1/2 стакана) воды 2-3 раза в день, через час после еды. Высшая разовая доза при пероральном приеме составляет 10 мл (2 чайные ложки); максимальная суточная — 20 мл. Курс лечения составляет 21 день. Кратность курсов определяет врач в зависимости от тяжести течения заболевания и достигнутого эффекта лечения.

Для усиления терапевтического эффекта наряду с применением ПРОСТАТОФИТА внутрь, его назначают ректально (разведение 1:20). ПРОСТАТОФИТ в виде микроклизм применяют 1 раз в сутки (лучше всего на ночь) ежедневно в течение 2-3 недель, в зависимости от течения заболевания. Для микроклизм 5 мл препарата разводят в 100 мл (1/2 стакана) теплой воды (35-40⁰С).

Побочное действие. Возможны аллергические реакции (крапивница, зуд).

Противопоказания. При обоих путях применения: повышенная чувствительность к компонентам препарата; при приеме внутрь: хронический алкоголизм, непереносимость алкоголя, гиперацидные состояния, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, цирроз печени, прием нейролептиков и транквилизаторов, детский возраст до 14 лет.

Передозировка. Передозировка препарата ПРОСТАТОФИТ сопровождается острым алкогольным отравлением, симптомы аналогичны симптомам отравления этиловым спиртом. При концентрации спирта в крови 3-4 г/л (300-400 мг/%) развивается выраженная интоксикация. Лечение

коматозного состояния заключается в промывании желудка, приеме адсорбентов; терапия -симптоматическая. Хороший эффект дает применение кислорода. Возможно, возникнет необходимость в искусственном дыхании.

Особенности применения. *Перед применением взболтать.* В период применения препарата (внутри) следует избегать потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстрых двигательных и психических реакций (управление транспортными средствами и механизмами).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Так как ПРОСТАТОФИТ содержит спирт этиловый 70%, возможно потенцирование действия снотворных и седативных препаратов, транквилизаторов.

Условия и срок хранения. Хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Срок годности – 2 года.

Условия отпуска. Без рецепта.

Упаковка. По 100 мл в банках стеклянных; по 100 мл в банках полимерных; по 100 мл во флаконах полимерных.

Производитель. ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ».

Адрес. Украина, 61091, г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20.

**Заместитель директора Государственного
фармакологического центра МЗ Украины**

В.Г. Лизогуб